

ANTIDOTI CON PRIORITÀ 3

CALCIO EDETATO BISODICO (EDTA)							
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Sodio calcio edetato	Salf	<i>soluzione iniettabile</i> fiala 1 g/10 ml (conf. 5 fiale) validità 36 mesi	piombo (cadmio, manganese, alcuni radioisotopi, rame, zinco)	endovenosa	fino a 4-5 g/die	10 fiale	possibile somministrazione ripetuta

DEFEROXAMINA MESILATO							
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Desferal	Novartis Farma	<i>polvere liofilizzata</i> flacone 500 mg/5 ml (conf. 10 flaconi) validità 48 mesi	ferro (intossicazione acuta) alluminio	endovenosa	15 mg/Kg/ora (fino a max 6 g/die)	10-20 flaconi da 500 mg	possibile somministrazione ripetuta
Deferoxamina Noriderm	Noriderm Enterprise Ltd	<i>polvere liofilizzata</i> flacone 500 mg (conf. 10 flaconi) flacone 2 g (conf. 1 flacone) validità 48 mesi					

DMPS (acido 2,3 dimercapto 1 -propanzolfonico) unitiolo (**)

Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Dimaval	Heyl ¹	soluzione iniettabile fiala 250 mg/ 5 ml (conf. 1-5 fiale)	cadmio, cobalto, mercurio, nichel, oro, piombo, polonio.	endovenosa	3-5 mg/Kg ogni 4 ore per 4-6 gg (segue somministrazione per os)	25 fiale	durata del trattamento da concordare con lo specialista del CAV
		capsula rigida 100 mg (conf. 10-20 capsule) validità 36 mesi		orale			

¹ Non registrato in Italia: richiedibile a distributori di farmaci esteri [prodotto da Heyl Chem-Pharm, Fabrik GmbH & Co.KG, Germania. info@hey-berlin.de]

FENTOLAMINA MESILATO (**)

Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Regitin	Novartis	soluzione iniettabile fiale 5 mg/ml (conf. 5 fiale) validità 60 mesi	crisi ipertensiva da agenti vasocostrittori o stimolanti	endovenosa	1-5 mg ev da ripetere al bisogno	5 fiale	somministra- zione unica
Phentolamine Mesylate Injection	Sandoz	soluzione iniettabile fiala 5 mg/1 ml (conf. 10 fiale) validità: dato attualmente non disponibile	stravaso da agenti vasocostrittori	infiltrazione locale	5-10 mg in 10-15 ml di fisiologica		

¹ Non registrato in Italia: richiedibile a distributore di farmaci esteri [prodotto da Novartis Pharma. KK, Giappone - Sandoz Canada Inc.].

ANTIDOTI CON PRIORITÀ 3

PENICILLAMINA							
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
D-Penicillamina ¹	SCFM	capsula 150 mg (conf. 50 capsule) validità 24 mesi	rame, morbo di Wilson (mercurio, piombo, zinco, oro, arsenico, cadmio) cistinuria	orale	1-1.5 g/die (dosi crescenti fino a max 2g/die) suddivisi in 3-4 somministrazioni/die	1 confezione	durata del trattamento da concordare con lo specialista
Metalcaptase ²	Heyl	capsula 300 mg (conf. 100 capsule) validità 60 mesi					

¹ Approvvigionamento regolamentato: il farmaco viene prodotto dallo *Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (SCFM)* di Firenze sulla base delle richieste annuali provenienti da Ospedali che hanno in trattamento pazienti affetti da morbo di Wilson, informazioni presso CAV

² Non registrato in Italia: approvvigionabile tramite *SCFM* (https://portalefarmaci.agenziaindustriedifesa.it/?page_id=35672) o richiedibile a distributori di farmaci esteri [prodotto da *Heyl Chem-Pharm, Fabrik GmbH & Co.KG*, Germania. info@hey1-berlin.de]

PROPILTIOURACILE ¹							
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Propycil ²	Klocke Pharma	compressa 50 mg (conf. 60 compresse) validità 24 mesi	ipertiroidismo da farmaci	orale	75-600 mg/die	1 confezione da 60 cp	durata del trattamento da concordare con lo specialista

¹ In caso di carenza può essere sostituito con il benzil tiouracile.

² Farmaco prodotto all'estero, importato in Italia dalla ditta *Mylan Italia Srl*

SUCCIMER (DMSA) (††)¹

Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Chemet	Recordati Rare Diseases Inc.	compressa 100 mg (conf. 100 compresse) validità 18 mesi	antimonio, argento, arsenico, bismuto, cadmio, cobalto, lewisiti, mercurio, oro,	orale	dose d'attacco: 10-30 mg/Kg ogni 8 ore per 5 gg	6 confezioni da 200 mg	durata del trattamento da concordare con lo specialista del CAV
Succicaptal	Serb Laboratoires	capsula 200 mg (conf. 15 capsule) validità 24 mesi	piombo, platino, polonio, rame		dose di mantenimento: 10-30 mg/kg ogni 12 ore per 15 gg		

¹ Non registrato in Italia: richiedibile a distributore di farmaci esteri [prodotto da Recordati Rare Diseases Inc., USA - Serb, Francia; <https://serb.com>; info@serb.eu]

ANTIDOTI CON PRIORITÀ 4

AMILE NITRITO 		T < 15°C					
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata 	Durata media del trattamento
 Amile nitrito 0,3 ml	Salf ¹	<i>soluzione inalatoria</i> fiala 1 ml (3 gtt di principio attivo) (conf. 5 fiale) validità 24 mesi	cianuri antidoto da utilizzare in fase extraospedaliera e nelle grandi emergenze nell'impossibilità di disporre di antidoti più sicuri ed efficaci e in accordo con il CAV di riferimento	inalatoria	rompere 1-2 fiale su garza e far inalare per 30 sec ogni minuto per 3 minuti. Il trattamento è ripetibile fino a inizio somministrazione di altri antidoti per via endovenosa. Non superare una metaHb del 30% (la misurazione della MetHb è possibile in ambiente extra-ospedaliero con alcuni tipi di saturimetro).	200 fiale. Riservato al 118, non utile in PS se non in caso di massiccio afflusso	somministrazione temporanea, fino a intervento con altri antidoti di prima scelta

¹ Galenico industriale.

ANTITOSSINA BOTULINICA (***) ^{1,2}								❄
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento	
Botulinum Antitoxin ABE	Biomed	<i>soluzione iniettabile siero di origine equina</i> fiala 10 ml tipo A: 5000 UI tipo B: 5000 UI tipo E: 1000 UI (conf. 1-5 fiale) validità 36 mesi			da 50 a 100 ml	5 fiale		
BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent) ¹	Emergent Biosolutions Canada Inc.	<i>soluzione iniettabile F(ab')₂ e F(ab)₂ di origine equina</i> fiala 20 - 50 ml tipo A ≥ 4500 U tipo B ≥ 3300 U tipo C ≥ 3000 U tipo D ≥ 600 U tipo E ≥ 5100 U tipo F ≥ 3000 U tipo G ≥ 600 U (conf. 6 fiale) validità 60 mesi	botulismo	endovenosa	adulto (≥ 17 anni): 1 fiala pediatrico (da 1 a 17 anni): 20-100% della dose dell'adulto bambini (< 1 anno): 10% della dose dell'adulto, indipendentemente dal peso corporeo	1 fiala	singola somministrazione	

¹ Non registrato in Italia: richiedibile a distributori di farmaci esteri [prodotto da BIOMED, Polonia, biuro@biomed.com.pl - Emergent Biosolutions Canada Inc., Canada]

² Antidoto reso disponibile dal Ministero della Salute attraverso la SNAF in presenza di un caso sospetto/accertato di botulismo (procedura attivabile contattando il CAV di Pavia)

³ Conservare ad una temperatura ≤ -15°C; una volta scongelato conservare tra +2°C e +8°C, per un massimo di 36 mesi o fino a 48 mesi dalla data di produzione (considerare la data più prossima)

ANTIDOTI CON PRIORITÀ 4

ARGATROBAN							
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Novastan	Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH-D	soluzione iniettabile flacone 250 mg/2,5 ml (conf. 1 flacone) validità 36 mesi	trombocitopenia da eparina inibizione diretta della trombina	endovenosa	2-10 mg/kg/min	1 confezione	da concordare con lo specialista del CAV

BLU DI PRUSSIA (**)							
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Antidotum Tallii adiogardase	Heyl	capsula 500 mg (conf. 36 capsule) validità 60 mesi	cesio tallio	orale (se difficoltà di deglutizione, sciogliere il contenuto della capsula in acqua)	adulti: 3g ogni 8 ore (18 capsule/die) bambini (2-12 anni): 1 g ogni 8 ore donne gravide o in allattamento: 130 mg/die	1 confezione (36 capsule)	somministrazione ripetuta

¹ Non registrato in Italia: richiedibile a distributori di farmaci esteri [prodotto da Heyl Chem-Pharm, Fabrik GmbH & Co.KG, Germania. info@hey-berlin.de]

DIETILENTRIAMINOPENTAACETATO DI CALCIO (Ca-DTPA) E DI ZINCO (Zn-DTPA) (**)							
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Ditripentat-Heyl (Ca-DTPA) Zink-Trinatrium-pentetat (Zn-DTPA)	Heyl	soluzione iniettabile fiala 1 g/5 ml (conf. 5 fiale) validità 60 mesi soluzione iniettabile fiala 1055 mg/5 ml (conf. 5 fiale) validità 60 mesi	nuclidi di metalli pesanti transuranici: americio, berkelio, colbalto, curio, ittrio, plutonio.	endovenosa lenta (da 30 min a 2 ore)	dose di attacco adulto: 1 fiala/die bambino: 25-50 mg/Kg/die (non superare la dose di 1g/die) dosi successive ripetibili stessa posologia del calcico, ma preferibile in gravidanza e per trattamenti prolungati	rivolgersi al CAV	durata del trattamento da concordare con lo specialista del CAV

¹ Non registrato in Italia: richiedibile a distributori di farmaci esteri [prodotto da Heyl Chem-Pharm, Fabrik GmbH & Co.KG, Germania. info@hey-berlin.de]

DIMERCAPROLO (BAL) (**) ^{1,2}							
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Dimercaprol Injection IP (B.A.L.)	Samarth Life Sciences	<i>soluzione iniettabile</i> fiala 100 mg/2 mL (conf. 2 fiale) validità dato attualmente non disponibile	arsenico, mercurio inorganico, piombo e oro	intramuscolare	3-5 mg/kg ogni 4-6 ore per 2 gg, In seguito ogni 12 ore per 7-10 gg	20 fiale da 200 mg/2 ml	durata del trattamento da concordare con lo specialista del CAV
B.A.L.	Serb	<i>soluzione iniettabile</i> fiala 200 mg/2 mL (conf. 12 fiale) validità 36 mesi					

¹ Non registrato in Italia: richiedibile a distributore di farmaci esteri [prodotto da *Samarth Life Sciences*, India; *Serb*, Francia, <https://serb.com>, info@serb.eu]

² Da utilizzare solo in assenza di altri antidoti con un miglior profilo di sicurezza (es. DMPS)

GLUCARPIDASE (**) ¹							
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Voraxaze	Serb ¹	<i>polvere liofilizzata</i> fiala 1000 UI (conf. singola fiala) validità 48 mesi	riduzione tossicità da metotrexate in pazienti con insufficienza renale	endovenosa	50 unità/kg in 5 minuti	1-5 fiale	singola somministrazione, ripetibile in alcuni casi

¹ Approvvigionamento indicato nei servizi di oncologia con pazienti in trattamento con metotrexate

² Alla data della stampa, prodotto distribuito da *Avas Pharmaceuticals Srl* [fordini@avaspharma.com, administration@avaspharma.com, info@pec.avaspharma.com; customer service: tel1. 02 47923811, tel2. 02 94756990 (urgenze)].

IMMUNOGLOBULINE UMANE ANTIRABBITA (**) ^{1,2}							
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Berirab P	CSL Behring	<i>soluzione iniettabile, immunoglobuline di origine umana</i> 300 UI/2 ml (conf. singola siringa pre-riempita) validità 36 mesi	profilassi rabbia	perilesionale e intramuscolare a distanza dal morso	20 UI/Kg	7 siringhe	singola somministrazione

¹ Non registrato in Italia [titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Germania: *CSL Behring GmbH-Marburg*. Rappresentante in Italia: *CSL Behring S.p.A.*]

² In caso di carenza o indisponibilità di immunoglobuline umane antirabbia, è possibile reperire immunoglobuline/frammenti anticorpali eterologhi (es. *Equirab*, fiala da 1.500 UI/5 ml, prodotto da *Bahrat Serums and Vaccines*, India); altri produttori vari, India, richiedibili ai distributori di farmaci esteri

ANTIDOTI CON PRIORITÀ 4

IODURO DI POTASSIO (*)							
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Preparato galenico		<p style="text-align: center;"><i>Varie formulazioni</i></p> <p>Capsula rigida o compressa 65 mg Capsula rigida o compressa 130 mg</p> <p style="text-align: center;">validità variabile in relazione al produttore</p>					
Thyrosafe	Serb ²	<p>compressa 65 mg</p> <p style="text-align: center;">validità: 10 anni</p>	iodio radioattivo	<p style="background-color: #ffff00;">orale</p> <p>(se difficoltà di deglutizione, tritare la compressa o sciogliere il contenuto della capsula in acqua)</p>	<p>adulti (da 18 anni e adolescenti peso corporeo > 70 Kg): 130 mg/die bambini (3-18 anni): 65 mg/die bambini (1 mese-3 anni): 32 mg/die neonati: 16 mg/die donne gravide o in allattamento: 130 mg/die</p>	non definita – fare riferimento al CAV	da concordare con lo specialista del CAV
Kaliumjodid G.L.	G.L. Pharma GmbH ³	<p>compressa 65 mg</p> <p style="text-align: center;">validità: 10 anni</p>					

Disponibile presso CAV e SNAF (secondo procedura specifica).

Non registrato in Italia: richiedibile a distributori di farmaci esteri [prodotto da: *Serb*, <https://serb.com>, info@serb.eu].

Non registrato in Italia: richiedibile a distributori di farmaci esteri [prodotto da: *G.L. Pharma GmbH*, Austria, office@gl-pharma.at].

SIERO ANTIDIFTERITE ()**


Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Diphtheria Antitoxin	Vins Bioproducts Limited Premium Serums & Vaccines Pvt. Ltd Biological E. limited	soluzione iniettabile, F(ab) di origine equina fiala 10000 UI/10 ml (conf. 1 fiala) validità 24 mesi	difterite	endovenosa	10000-30000 UI (casi lievi o moderati); 100000 UI (casi severi)	10 fiale	singola somministrazione

¹ Non registrato in Italia: richiedibile a distributori di farmaci esteri [prodotto da: *Vins Bioproducts Limited*, India; www.vinsbio.in; *Premium Serums and Vaccines Pvt. Ltd.*, India - www.premiumserums.com; *Biological E. Limited*, India www.biologica.com/index.html]

ANTIDOTI CON PRIORITÀ 4

SIERO ANTIMALMIGNATTA (**)							❄
Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione- (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Antivenin (Latrodectus Mactans)	Merck Sharp & Dohme	<p><i>polvere liofilizzata, IgG di origine equina</i></p> <p>flacone 6000 LD50 1 flac polvere 1 fiala 1 ml per test di sensibilità</p> <p>(1 conf. contiene 1 kit)</p> <p>validità 36 mesi</p>	<p>morso di ragni appartenenti alla specie Latrodectus Mactans (vedova nera)</p>	<p>endovenosa</p>	1 flacone	<p>1-3 fiale (a seconda del tipo di siero; rivolgersi al CAV)</p>	<p>generalmente unica somministrazione</p>
Aracmyn Plus ²	Laboratorios Silanes	<p><i>polvere liofilizzata F(ab')₂ di origine equina</i></p> <p>1 fiala polvere 600 LD50 1 fiala solvente 5 ml</p> <p>(confezione singola)</p> <p>validità 36 mesi</p>			da 1 a 3 fiale in base ai sintomi e all'età		
Red Back Spider Antivenom (CSL)	CSL Seqirus	<p><i>soluzione iniettabile proteine plasmatiche di origine equina</i></p> <p>1 fiala 500 U (confezione da 1 fiala)</p> <p>validità 36 mesi</p>	<p>morso di ragni appartenenti alla specie Latrodectus Hasselti</p>	<p>intramuscolo endovenosa</p>	1 fiala		

¹ Non registrato in Italia, richiedibile ai distributori di farmaci esteri [prodotto da Merck Sharp and Dohme Corp., a subsidiary of Merck&Co., Inc., USA; www.merck.com - Laboratorio Silanes, Messico (www.silanes.com.mx, contacto@silanes.com.mx); Seqirus Pty Ltd, Australia, www.csiseqirus.com.au/products]

² Richiedibile a Serb, Francia (https://serb.com; info@serb.eu)

VACCINO ANTIRABICO¹



Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Rabipur ²	GlaxoSmithkline Vaccines Srl	<p><i>polvere per soluzione iniettabile</i></p> <p>Fiala ≥ 2,5 UI/ml</p> <p>validità 48 mesi</p>	immunizzazione attiva per la rabbia	intramuscolare	1 fiala in urgenza (le ulteriori somministrazioni, previste a distanza di giorni, possono essere ripetute presso gli ambulatori delle ASL)	1 fiala	singola somministrazione in urgenza

¹ Farmaco disponibile presso i servizi di prevenzione e/o vaccinali delle ASST/ASL/ATS di competenza.

² Alla data della stampa prodotto importato da *Bavarian Nordic A/S*, tramite la ditta *Alloga Italia Srl* [www.alloga-europe.com].

URIDINA TRIACETATO (**)^{1,2}

Nome Commerciale	Aziende Produttrici	Forma farmaceutica / formulazione (validità)	Principali indicazioni d'uso	Via di somministrazione appropriata per l'uso antidotico	Posologia	Scorta minima consigliata	Durata media del trattamento
Vistogard	Wellstat Therapeutics	<p><i>polvere</i></p> <p>busta 10 g (conf. 20 buste)</p> <p>validità 36 mesi</p>	tossicità da 5-fluorouracile o capecitabina	orale	10 g (1 busta) ogni 6 h per 20 dosi (5 giorni). Iniziare il trattamento tra 3 h e 4 giorni dopo la somministrazione di 5-fluorouracile o capecitabina	vedi nota ²	5 giorni

¹ Non registrato in Italia (www.vistogard.com), distribuito da *Serb*, Francia, <https://serb.com> [gli ordini vanno trasmessi in orario lavorativo (9:00-18:00) a adv.serb.eu e orderentry-italy@serb.eu, +39 0521 882565 e in orario extra lavorativo e durante prefestivi e festivi a adv.serb.eu e astreinte@serb.eu, + 33 1 44 62 55 17]

² Approvvigionamento indicato nei servizi di oncologia con pazienti in trattamento con 5-fluorouracile o capecitabina

scheda antidoto

Ipecacuana sciroppo emetico

PRINCIPIO ATTIVO

Ipecacuana sciroppo emetico

NOME COMMERCIALE

Ipecavom® ed altri

FORMULAZIONE: sciroppo flacone 15 ml al 7%

SOMMINISTRAZIONE: orale

PROVENIENZA : Farmaco Estero

INDICAZIONI DI USO

emesi, induzione

scheda antidoto

Sugammadex

PRINCIPIO ATTIVO

Sugammadex

NOME COMMERCIALE

Bridion®

FORMULAZIONE: soluzione iniettabile fiala 200mg/2ml - 500mg/5ml

SOMMINISTRAZIONE: endovenosa

PROVENIENZA : Farmaco Italiano

INDICAZIONI DI USO

rocuronio, inversione blocco neuromuscolare indotto da
vecuronio, inversione blocco neuromuscolare indotto da

scheda antidoto

Simeticone

PRINCIPIO ATTIVO

Simeticone

NOME COMMERCIALE

Simegut® ed altri

FORMULAZIONE: gocce orali sospensione - flacone 30 ml al 6,66%

SOMMINISTRAZIONE: orale

PROVENIENZA : Farmaci italiano

INDICAZIONI DI USO

schiumogeni

INDICE ANALITICO PER INDICAZIONE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Acetaminofene	30	Funghi contenenti amanitina	30, 43
Acido valproico, iperammoniemia da	39	Glicole etilenico	14, 23, 43
Adsorbente aspecifico	20	Glicosidi simildigitalici	23
Agenti nervini	15	Idrazina	29
Alcalinizzazione plasma e urine	16	Ifosfamide	17, 43
Alcool etilico	43	Iodio radioattivo	54
Alcool metilico	14, 23, 31	Ipertermia associata a ipertono muscolare	35
Alluminio	46	Ipertermia maligna	20
Amanitina	30, 43	Iperteroidismo da farmaci	48
Americio	52	Ipertono colinergico	15
Angioedema da ACE-inibitori	38	Ipoclorito di sodio, ingestione di	28
Angioedema ereditario	38	Isoniazide	29
Antiblastici, stravasato da	58	Ittrio	52
Anticoagulanti warfarinici / anticoagulanti dicumarolici / anticoagulanti superwarfarinici	29	Lavaggio intestinale	27
Anticolinergici, sindrome centrale da	22	Lewisiti	49
Antimonio	49	Malmignatta	56
Antiruggine	18, 19	Manganese	46
Apixaban	14	Mercurio	47, 48, 49, 53
Argento	49	Metaemoglobinemia	17, 44
Arsenico	48, 49, 53	Metanolo	14, 23, 31
Benzodiazepine	22	Metotrexate	32, 53
Berkello	52	Monometilidrazina	29
Beta bloccanti	24	Morbo di Wilson	48
Bismuto	49	Nichel	47
Botulismo	51	Nuclidi di metalli pesanti transuranici	52
Cadmio	46, 47, 48, 49	Oppioidi	25
Candeggina classica	28	Oro	47, 48, 49, 53
Capecitabina	57	Ossalati, contatto cutaneo con	19, 34
Carbamati	15	Ossalati, ipocalcemie da	18, 19
Cardiotossicità refrattaria da anestetici e farmaci liposolubili	21	Paracetamolo	30
Catarsi	25, 27	Piombo	46, 47, 48, 49, 53
Cesio	52	Pirimetamina	32
Chinino, ipoglicemia da	41	Platino	49
Cianuri	24, 28, 50	Plutonio	52
Ciguatossina	40	Polonio	47, 49
Cistinuria	48	Rabbia, profilassi e immunizzazione attiva	53, 57
Cloroquina	21	Ragni appartenenti al genere Latrodectus	56
Cobalto	47, 49, 52	Rame	46, 48, 49
Curari anticolinergici	40	Rivaroxaban	14
Curio	52	Schiumogeni	28
Dabigatran	24	Sindrome anticolinergica centrale	22
Derivati del petrolio/solventi	26	Sindrome maligna da neurolettici	33, 35
Difterite	55	Sindrome muscarinica	15
Digossina	23	Solventi epatotossici	30
Disulfiram-etanolo	23	Sostanze schiumogene	28
Eparina	28	Sulfaniluree, ipoglicemia da	41
Eparina, trombocitopenia da	52	Tallio	52
Esteri organo fosforici	15, 42	Tossicità serotoninica	34
Etanolo	43	Tossina botulinica	51
Fenoli	26	Trimetoprim	32
Ferro	46	Vasocostrittori, stravasato e crisi ipertensiva da	47
5-Fluorouracile	57	Vedova nera	56
Fluoruri, contatto cutaneo con	19, 34	Vipera europea	36, 37
Fluoruri, ipocalcemie da	18, 19	Vitamina A	40
		Zinco	46, 48